LA FIÈVRE HÉMORRAGIQUE À SYNDROME RÉNAL

QUELLE EST LA CAUSE DE LA MALADIE ?

Elle est due à un virus.

QUELS SONT LES ANIMAUX POUVANT TRANSMETTRE LA MALADIE ?

Les rongeurs, surtout le Campagnol roussâtre.

COMMENT SE TRANSMET LA MALADIE ?

La transmission du virus se fait par inhalation de poussières contaminées par les déjections des rongeurs contaminés ou par manipulations de rongeurs.



QUELLES SONT LES ZONES GEOGRAPHIQUES TOUCHEES ET A QUELLES PERIODES ?



Le virus est surtout présent dans le **quart Nord Est de la France,** essentiellement en été.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?

Pas de symptôme pendant 1 semaine à 2 mois puis apparition de fièvre, frissons, maux de tête, douleurs diffuses (musculaires, dorsales, abdominales). Possibilités d'atteinte rénale, quelquefois grave.

QUELLES SONT LES ACTIVITES A RISQUE ?

Toute activité mettant en contact l'homme avec des **poussières contaminées** :

- travaux en milieu forestier
- travaux de terrassement, de rénovation ou de nettoyage de locaux inhabités (granges, hangars)

QUE FAIRE AFIN D'ÉVITER D'ÊTRE CONTAMINÉ ?

- Lutter contre la présence des rongeurs. Eviter de les attirer par des dépôts de nourriture.
- Effectuer une dératisation régulière notamment en automne lorsque les campagnols cherchent un refuge dans les habitations.
- Limiter l'exposition aux poussières lors du nettoyage des locaux restés inoccupés (port d'un masque conseillé).
- Porter au minimum des gants résistants et étanches en cas de manipulation de cadavres de rongeurs.
- Se laver les mains (eau potable et savon) systématiquement avant les repas.
- En cas de plaie : laver, savonner puis rincer. Désinfecter et recouvrir d'un pansement imperméable.

A SAVOIR !

En cas de fièvre et de douleurs, consulter systématiquement un médecin. La guérison a lieu généralement sans séquelle, parfois après plusieurs semaines.

Conception : www.carrergraphiste.com